

Số: 22 /HD-TTĐVNN
V/v: Hướng dẫn kỹ thuật phun hoá chất
phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên
địa bàn huyện Tam Đường năm 2019

Tam Đường, ngày 19 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 219/UBND-NN&PTNT, ngày 19 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Tam Đường về việc khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Để công tác phun hóa chất tiêu độc khử trùng đạt hiệu quả, an toàn và đảm bảo quy trình kỹ thuật đề ra của Nhà sản xuất. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn sử dụng hoá chất sát trùng cụ thể như sau:

1. Công dụng

- Hóa chất sát trùng Han-Iodine 10%, Povidine-10%, VirkonS... là iod hữu cơ có tác dụng sát trùng ở hầu hết các loại vi rút cúm gà, Newcastle, Gumboro, dịch tả lợn, dịch tả vịt, lở mồm long móng, phun phòng dịch tai xanh ở lợn, nhiệt thán, bệnh nghê...

- Vi khuẩn Gram -, vi khuẩn Gram +, xoắn khuẩn đơn bào, các loại nha bào, nấm mốc và khử làm mất mùi hôi thối.

- Thuốc dùng để khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, môi trường xung quanh khu chăn nuôi, vùng mổ ngoại khoa.

2. Cách sử dụng

- Han-Iodine 10%:

+ Tiêu độc chuồng trại: Pha 10ml dung dịch với 1 đến 2 lít nước sạch (1 lít dung dịch với 100 - 200 lít nước). Phun đều bề mặt chuồng, dụng cụ chăn nuôi và môi trường xung quanh. Tuần 1-2 lần, liên tục 2 - 3 tuần.

+ Sát trùng vết thương hay nốt lở loét do bệnh LMLM: Pha loãng ½ bôi trực tiếp lên vết thương.

+ Sát trùng tay chân, nơi tiêm, vùng mổ ngoại khoa: 10 ml/1 lít nước.

+ Sát trùng đầu vú, núm vú và tay vắt sữa, thụt rửa dạ con, âm đạo: 10 ml/1 lít nước.

- Povidine-10%:

+ Tiêu độc chuồng trại: pha với nước sạch 10ml/3 lít nước (1 lít dung dịch với 300 lít nước); phun đều bề mặt chuồng, dụng cụ chăn nuôi và môi trường xung quanh. Tuần 1 - 2 lần, liên tục 2 - 3 tuần.

+ Sát trùng vết thương hay nốt lở loét do bệnh lở mồm long móng: Pha loãng ½ bôi trực tiếp lên vết thương.

+ Sát trùng tay chân, nơi tiêm, vùng mổ ngoại khoa: 10ml/1 lít nước.

- Đối với các xã có ổ dịch: Phun 2 lần/ngày liên tục 7 ngày, sau đó tiến hành phun 3 lần/ tuần, liên tục ba tuần.

- Đối với phương tiện vận chuyển động vật: Phun đều, làm ướt toàn bộ lớp xe, các cửa xe, lồng, rọ nhốt động vật. Đối với các loại phương tiện khác: Phun đều, làm ướt các lớp xe, vỏ thân xe.

Chú ý:

- Chỉ dùng trong Thú y.

- Tránh thuốc tiếp xúc với da, niêm mạc mắt, tránh xa tầm tay trẻ em.

- Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Trên đây là nội dung hướng dẫn sử dụng hoá chất sát trùng của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tam Đường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Đài Truyền thanh Truyền hình huyện;
- Lưu: VT.

TRUNG TÂM DVNN
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Bích Thuận